



Klimatologisch seizoenoverzicht

lente 2026

1. Algemeen klimatologisch overzicht, lente 2026	1
2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, lente 2026	4
Overzicht van de seizoenswaarden sinds 1991	4
Recordwaarden en indeling sinds 1901	4
Evolutie van de dagwaarden	5
Vergelijking met de seizoenswaarden sinds 1991	6
3. Klimatologisch overzicht voor België, lente 2026	7
Geografische verdeling van de temperaturen	7
Geografische verdeling van de neerslag	8
Geografische verdeling van de droogte-index	8
Geografische verdeling van de zonnestraling	9
Geografische spreiding van de bliksemontladingen	9

1. Algemeen klimatologisch overzicht, lente 2026

Warme en zonnige lente

Zeer warm einde van de lente

Het **grootste deel** van de **lente** bestond uit een afwisseling van warmere en koudere periodes. Op het einde schoten de temperaturen echter de hoogte in. De derde decade van mei (21-31 mei) was **veruit de warmste ooit**.

De uiteindelijke **gemiddelde temperatuur van dit seizoen lag ruim boven de normale: 12,1°C** (normaal: 10,5°C). Dit is de **derde hoogste waarde** sinds het begin van de waarnemingen in 1833. Het record blijft staan op 12,3°C in 2007 en ook in 2011 was het net iets warmer (12,2°C).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen **-1,3°C** (27 maart) en **30,5°C** (29 mei).

We registreerden hier **9 zomerdagen [max≥25°C]** (normaal: 3,5 dagen) en **2 tropische dagen [max≥30°C]** (normaal: 0,2 dagen), **twee hoge waarden voor de lente:**

- **9 zomerdagen**, net als in 1945, goed voor een **derde plaats** sinds het begin van deze waarnemingen in 1892. Het record blijft staan op 13 dagen in 2018 en ook in 2007 waren er meer (11 dagen).
- **2 tropische dagen**, net als in 1944 en 2017, goed voor een **derde plaats** sinds het begin van deze waarnemingen in 1892. Het record blijft staan op 3 dagen in 1922 en 1998.

In ons land werd de **laagste temperatuur** op 27 maart geregistreerd: **-5,6°C** in **Mont-Rigi (Weismes)**. De **hoogste temperatuur van 33,2°C** werd op 26 mei in **Lier** gemeten.

Zonnige lente

In Ukkel waren alle drie de lentemaanden zonniger dan gemiddeld, dus ook de lente in haar totaal was zonniger dan gemiddeld: **644u 18min** (normaal: 495u 19min). Dit was de **vijfde zonnigste lente** voor de huidige referentieperiode, nog ruim achter het record van 2020 (740u 48min).

Iets minder neerslag dan gemiddeld

Maart was een net iets nattere maand, maar april was de **derde droogste aprilmaand** van de huidige referentieperiode. Hoewel mei natter dan gemiddeld was, bleef de **totale neerslaghoeveelheid van de lente net onder de normale waarde: 155,6 mm** (normaal: 165,6 mm).

Deze hoeveelheid viel hier op **34 dagen** (normaal: 43,5 dagen).

Het **grootste dagtotaal** bedroeg hier **14,0 mm** en werd op 13 maart geregistreerd.

De **gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden** in ons land lagen bijna overal onder de normale waarden en varieerden van ongeveer 45% van de normale aan de kust tot ongeveer 110% van de normale in Haspengouw.

De afgelopen lente vielen er **enkel op 30 mei** neerslaghoeveelheden van minstens 40 mm. De **grootste hoeveelheid was deze van Strée (Modave) met 107,3 mm.**

We registreerden afgelopen lente **25 onweersdagen** in ons land (normaal: 24,8 dagen).

Sneeuw

In Ukkel viel er **geen sneeuw tijdens deze lente.**

In de rest van ons land viel er gedurende **9 dagen** neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond, **allemaal in maart.** Gedurende **8 dagen lag er sneeuw op de grond** (13-15 maart en 25-29 maart). De **maximale dikte** werd in Mont-Rigi (Weismes) gemeten en bedroeg **13 cm op 26 maart.**

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de **periode 1991-2020** (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf **1991.**

2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, lente 2026

Overzicht van de seizoenwaarden sinds 1991

	Eenheid	Waarde	Normaal		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12.1	10.5	++	12.3	2007	7.7	2013
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	17	14.7	++	17.3	2011	11.5	2013
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	7.1	6.2		8.1	2024	4.1	2013
Neerslagtotaal	mm	155.6	165.6		285.2	2024	54.4	2025
Neerslagdagen	d	34	43.5		63	2024	20	2025
Sneeuwdagen	d	0	3.3		14	1995	0	2025
Onweersdagen in België	d	25	24.8		36	2024	13	2025
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.2	3.6	-	4	1994	3.2	2017
Overheersende windrichting		ZZW						
Zonneschijnduur	uu:mm	644:18	495:19	+	740:48	2020	364:00	1998
Globale zonnestraling	kWh/m ²	411.8	343.6	+	436.4	2020	281.6	2024
Relatieve vochtigheid	%	67	71	-	81	2024	61	2020
Dampdruk	hPa	9.4	9.1		11.2	2024	7.6	2013
Luchtdruk	hPa	1019	1015.6	+	1020.3	1997	1010.1	2018

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020 (referentie for het huidige klimaat).
 Indeling opgesteld voor de periode 1991–2026.
 Recordwaarden van 1991–2025.

Definitie van de indeling sinds 1991.

+++	---	Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++	--	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+	-	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991

Recordwaarden en indeling sinds 1901

	Eenheid	Waarde		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12.1	+++	12.3	2007	7.2	1962
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	17	+++	17.3	2011	10.9	1962
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	7.1	+	8.1	2024	3.2	1955
Neerslagtotaal	mm	155.6		299.7	1965	54.4	2025
Neerslagdagen	d	34	-	75	1979	20	2025
Zonneschijnduur	uu:mm	644:18	++	740:48	2020	276:52	1983

Indeling opgesteld voor de periode 1901–2026.
 Recordwaarden van 1901–2025.

Definitie van de indeling sinds 1901.

+++	---	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++	--	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+	-	Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Evolutie van de dagwaarden




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Vergelijking met de seizoenwaarden sinds 1991







Fig. 5

3. Klimatologisch overzicht voor België, lente 2026

Geografische verdeling van de temperaturen



Geografische verdeling van de neerslag




Fig. 9

Geografische verdeling van de droogte-index






Fig. 10

De *genormaliseerde neerslagindex (SPI)* laat toe om perioden van droogte te karakteriseren op basis van observaties van neerslag. De index vergelijkt op een gestandaardiseerde manier de neerslag voor een duur van 3 maanden (SPI-3) met een referentieperiode (1991–2020). De klassen “droog/nat”, “zeer droog/nat” en “uiterst droog/nat” komen overeen met herhalingsperioden van respectievelijk 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar.

Geografische verdeling van de zonnestraling



Geografische spreiding van de bliksemontladingen



Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens verzameld door het bliksemdetectiesysteem van het KMI. Dit systeem observeert in realtime de totale elektrische activiteit boven België. Het bestaat uit een netwerk van sensoren die de elektromagnetische straling van blikseminslagen opvangen. Door de gegevens van elke sensor te combineren, kunnen blikseminslagen op de grond en ontladingen in de wolken worden gelokaliseerd. De bovenstaande statistieken omvatten beide soorten ontladingen.

Deze voorlopige kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 juni 2026. Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via info@meteo.be.

Disclaimer

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens in tabellen, teksten en grafieken komen uitsluitend toe aan het KMI. De publicatie van deze gegevens op de website van het KMI strekt niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Gebruiker van de gegevens verbindt er zich toe om, in elke publicatie waarin gebruik gemaakt wordt van de gegevens, het KMI als

bron van deze gegevens te vermelden. Het is in geen geval toegestaan om op basis van de gegevens in tabellen, teksten en grafieken meteorologische of klimatologische diensten te verstrekken. Het KMI zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade die uit het gebruik van de gegevens zou kunnen voortvloeien. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen het KMI en de Gebruiker trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Zo niet, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 2026